

¡ALTO! LEA ESTE PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO Y
CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRICOLAS ANTES DE
USAR ESTE

FMC

REGALIA MAXX 20 SC

**FUNGICIDA-BOTÁNICO
REYNOUTRIA SACHALINENSIS**

**ANTÍDOTO: NO TIENE
DENSIDAD: 1.14 g/cm³ a 20°C**

**"ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE Y/O SE INHALA
PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y LA PIEL POR EXPOSICIÓN".**

"NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACION"

**"MANTENGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS, PERSONAS MENTALMENTE
INCAPACES, ANIMALES DOMESTICOS, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS".**



USO AGRONÓMICO: Fungicida botánico

MODO DE ACCIÓN: Regalia Maxx es un inductor de resistencia sistémica el cual promueve el sistema de defensa de la planta mediante la producción de fitoalexinas, compuestos fenólicos y antioxidantes. Induce a la producción de ácido ferúlico el cual favorece la lignificación de paredes celulares que resisten la penetración de los patógenos. Además, inhibe la germinación de hongos e induce a la producción de glucanasa, compuesto que rompe las paredes celulares de los patógenos.

EQUIPO DE APLICACIÓN: REGALIA MAXX 20 SC, es aplicado con cualquier equipo de aplicación, ya sea terrestre (aspersoras de mochila o equipos acoplados al toma de fuerza del tractor) o por vía aérea. Verifique el equipo de aplicación se encuentre en buen estado de funcionamiento, que no tenga fugas y que tenga la boquilla adecuada al volumen de agua deseado para aplicar. Utilice volúmenes de agua entre 200 a 400 L/ha en aplicaciones terrestres y en aplicaciones aéreas de 15 a 30 L/ha. Utilice boquillas de cono hueco o microner. Lave el equipo de aplicación después de cada jornada de trabajo.



FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA: Antes de utilizar REGALIA MAXX 20 SC, agite el envase. Para preparar la mezcla agregue primero agua hasta la mitad de la capacidad del tanque de mezclado y en un recipiente aparte prepare la pre-mezcla del producto de REGALIA MAXX 20 SC en la dosis recomendada. Agite y vacíe la solución de la pre-mezcla en el tanque de mezclado. Agregue agua hasta la totalidad de la capacidad del tanque, sin dejar de agitar a fin de homogeneizar la solución de la mezcla. Recuerde tener siempre el equipo adecuado para realizar la mezcla como paletas para agitar, cubetas y un medidor para líquidos. Utilice siempre el equipo de protección. No aplique cuando esté soplando el viento, y suspenda las aplicaciones si detecta la proximidad de lluvias, suspender por lo menos dos horas antes de que llueva.



RECOMENDACIONES DE USO:

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS	FRECUENCIA DE APLICACIÓN
Papa (<i>Solanum tuberosum</i>)	Tizón Temprano (<i>Alternaria solani</i>)	1-2 L/Ha	Realizar de 4-6 aplicaciones al follaje a intervalos de 7 días. Se recomienda aplicar en forma preventiva o a la aparición de los primeros síntomas de la enfermedad en rotación con otros fungicidas de diferente familia química.
Tomate (<i>Lycopersicon esculentum</i>)	Tizón Temprano (<i>Alternaria solani</i>) Oidio (<i>Oidiosis haplophylli</i>) (<i>Leveillula taurica</i>)	1-2 L/Ha	
Chile (<i>Capsicum anuum</i>)	Tizón Temprano (<i>Alternaria solani</i>) Oidio (<i>Oidiosis haplophylli</i>) (<i>Leveillula taurica</i>)	1-2 L/Ha	
Tabaco (<i>Nicotiana tabacum</i>)	Moho azul (<i>Peronospora tabacina</i>)	1-2 L/Ha	
Maní (<i>Arachis hypogaea</i>)	Mancha corchosa (<i>Leptosphaerulina crassiasca</i>) Mancha temprana (<i>Cercospora arachidicola</i>) Alternaria (<i>Alternaria spp</i>) Roya (<i>Puccinia arachidis</i>)	1-2 L/Ha	
Cucurbitáceas	Mildiú polvoso (<i>Erysiphe cichoracearum</i>)	1-2 L/Ha	
Frijol (<i>Phaseolus vulgaris</i>)	Antracnosis (<i>Colletotrichum indemthianum</i>) Oidium (<i>Erysiphe polygoni</i>)	1-2 L/Ha	
Aguacate (<i>Persea americana</i>)	Antracnosis (<i>Colletotrichum spp.</i>)	1-5 L/Ha	
Cítricos	Antracnosis de flor (<i>Colletotrichum acutatum</i>)	1-5 L/Ha	
Papaya (<i>Carica papaya</i>)	Antracnosis (<i>Colletotrichum spp.</i>)	1-5 L/Ha	
Fresa (<i>Fragaria virginiana</i>)	Cenicilla (<i>Sphaerotheca humili</i>)	1-2 L/Ha	
Banano (<i>Musa spp</i>)	Sigatoka negra (<i>Mycosphaerella fijiensis</i>)	1-2 L/Ha	

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACION Y LA COSECHA: No hay restricción.

INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA: Se puede ingresar al área tratada en cuanto seque la solución aplicada. En caso de mezclas, guardar la recomendación dada para los otros productos.

FITOTOXICIDAD: No se ha reportado fitotoxicidad de REGALIA MAXX 20 SC cuando se emplea bajo las dosis y las recomendaciones de la etiqueta.

COMPATIBILIDAD: REGALIA MAXX 20 SC es compatible con muchos de los plaguicidas de uso común, fertilizantes, aditivos y surfactantes. No obstante, se recomienda revisar la compatibilidad en la mezcla de tanque con productos agroquímicos nuevos en el mercado o cuando exista alguna duda del asistente técnico.

PRECAUCIONES, ADVERTENCIAS DE USO

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: Conserve en el envase original y cerrado en un lugar seco y fresco, y bien ventilado fuera del alcance directo de la luz solar. Mantenga los recipientes cerrados cuando no estén en uso.

"NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN"

"MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

"NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACION DE ESTE PRODUCTO"

"BAÑESE DESPUES DE TRABAJAR Y PONGASE ROPA LIMPIA"



SINTOMAS DE INTOXICACION: Este producto es irritante a la piel y ojos. La inhalación de los rociados o fumigados, puede causar una irritación severa de las vías respiratorias, caracterizada por tos, asfixia, o falta de aliento.

PRIMEROS AUXILIOS

POR INGESTION: No provoque el vómito, dar a beber 2 vasos de agua, enjuague el área bucal y acudir al médico. No administre nada por la boca a una persona inconsciente.

POR INHALACION: Retirar el paciente del área contaminada y colocarlo en un lugar fresco y ventilado. Manténgalo en reposo.

POR CONTACTO CON LOS OJOS: Retirar los lentes de contacto y enjuagar inmediatamente con abundante agua, también debajo de los párpados, por lo menos por 15 minutos, no use ungüento oftálmico. Si los síntomas persisten consultar al médico.

POR CONTACTO CON LA PIEL: Quítese la ropa contaminada. Lavar inmediatamente el área de la piel afectada con abundante agua durante 15 minutos. En caso de irritación cutánea, consultar al médico.

NUNCA DE A BEBER NI INDUZCA AL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA”

ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO MÉDICO: No tiene antídoto. Seguir tratamiento sintomático y de soporte.

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN:

PAÍS	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN	TELÉFONO
GUATEMALA	Centro de Información y Asistencia Toxicológica	223-0080 1-901-00298-32
EL SALVADOR	Hospital Nacional Rosales	2231-9262
HONDURAS	Hospital Escuela	232-3372/2323057
NICARAGUA	Centro Nacional de Toxicología	289-4700 ext.1464
COSTA RICA	Centro Nacional de Control de Intoxicaciones	2223-1028
PANAMÁ	Centro Nal. de Investigaciones e Información de Medicamentos y Tóxicos	523-4948
REP.DOMINICANA	Hospital Dr. Luis E. Aybar Hospital Francisco Moscoso Puello	809-332-6666 809-681-7828

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DE LA SALUD Y EL AMBIENTE:
No contamine ríos, lagos y estanques con este producto o con envases o empaques vacíos.

MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES:
Durante el manejo del producto, evite la contaminación de suelos, ríos, lagunas, arroyos, presas, canales o depósitos de agua, lavando o vertiendo en ellos residuos de plaguicidas o envases vacíos. En caso de dispersión accidental del producto, se deberá de usar equipo de protección personal, coleccionar los desechos del producto en un recipiente hermético y enviarlos a un sitio autorizado para su tratamiento y disposición final. Los envases vacíos deberán lavarse antes de desecharse, con un triple enjuague. Maneje el envase vacío y los residuos del producto conforme a lo establecido la ley.

“EL USO DE LOS ENVASES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS PONEN EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE”

AVISO DE GARANTÍA: Garantizamos que la composición de este producto corresponde a lo indicado en la etiqueta. Aunque sus instrucciones de uso se basan en múltiples pruebas, no damos una garantía expresa o implícita sobre los resultados al usarlo ya que su aplicación y manejo están fuera de nuestro control.

FABRICANTE Y FORMULADOR

IMPORTADO POR:



2121 Second St, Ste. B-107
Davis, CA 95618, USA

PAÍS	NÚMERO DE REGISTRO	FECHA DE REGISTRO
GUATEMALA	646-46	08/11/2013
BELICE		
EI SALVADOR	AG.2013-09-963	11/09/2013
HONDURAS	522-351-II	30/10/2013
NICARAGUA		
COSTA RICA		
PANAMÁ	6151	01/12/2012
REP. DOMINICANA	4441	11/02/2014